

Fingolimod patientkort med graviditetsinformation

Vigtig information at huske om din Fingolimod behandling

Dette uddannelsesmateriale indeholder vigtig sikkerhedsinformation om fingolimod og rådgivning om risikominimering.

Dette materiale er udviklet af Viatris.

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger på meldenbivirkning.dk. Bivirkninger kan også rapporteres til Viatris på pv.denmark@viatris.com

Inden behandling med fingolimod påbegyndes

- Fingolimod er kontraindiceret under graviditet og til kvinder i den fertile alder (inkl. teenagere), som ikke anvender sikker prævention.
- Din læge vil oplyse dig om risikoen for forsterskade (misdannelser til ufødte børn), og de nødvendige tiltag for at minimere denne risiko ved start af behandlingen og derefter regelmæssigt.
- Før behandling påbegyndes, skal der udføres en graviditetstest, og det negative resultat skal bekræftes af lægen.
- Din læge vil informere dig om behovet for sikker prævention under behandling og i 2 måneder efter afsluttet behandling. Tal med din læge om de bedst egnede præventionsformer for dig.
- Læs patient-, forælder-, og omsorgspersonsguiden, som din læge har givet.

Mens du er i behandling med fingolimod

- Kvinder må ikke blive gravide under behandling.
- Patienter skal anvende sikker prævention under behandling med fingolimod.

- Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen og i 2 måneder efter afsluttet behandling.
- Graviditetstests skal gentages med passende intervaller.
- Din læge vil regelmæssigt give dig vejledning i fingolimods alvorlige risici for fosteret.
- Tal med din læge, hvis du bliver gravid, eller du ønsker at blive gravid, da behandlingen med fingolimod i disse tilfælde skal afsluttes.
- I tilfælde af graviditet, vil din læge give dig vejledning.
- Din læge vil vejlede dig i de skadelige virkninger af fingolimod for fosteret og vil give en evaluering af det mulige udfald.

Efter afsluttet behandling med fingolimod

- Informer straks din læge, hvis du synes, din MS forværres (f.eks. svaghed eller synsforandringer), eller hvis du opdager nogle nye symptomer efter afsluttet behandling med fingolimod på grund af graviditet.
- Sikker prævention er nødvendig i 2 måneder efter afsluttet fingolimod behandling på grund af den tid, det tager fingolimod at forlade kroppen.