

## **ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

## Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Lipidil® NT 145mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

Φαινοφιβράτη

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.**

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμη και αν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι τα ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

**Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:**

- 1 Τι είναι το Lipidil NT και ποια είναι η χρήση του
- 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Lipidil NT
- 3 Πώς να πάρετε το Lipidil NT
- 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
- 5 Πώς να φυλάσσετε το Lipidil NT
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

### **1. Τι είναι το Lipidil NT και ποια είναι η χρήση του**

Το Lipidil NT ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων γνωστά ως «φιβράτες». Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για την μείωση των λιπιδίων στο αίμα. Για παράδειγμα, τα λιπίδια που είναι γνωστά ως τριγλυκερίδια.

Το Lipidil NT χρησιμοποιείται, μαζί με μια δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά και άλλη μη φαρμακευτική θεραπεία όπως άσκηση και απώλεια βάρους, για τη μείωση των επιπέδων των λιπιδίων στο αίμα.

Το Lipidil NT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα (στατίνες) σε ορισμένες περιπτώσεις όταν τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα δεν ελέγχονται με μία μόνο στατίνη.

### **2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Lipidil NT**

**Μην πάρετε το Lipidil NT εάν:**

- είστε αλλεργικοί στη φαινοφιβράτη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6, Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες).
- είστε αλλεργικοί στα φιστίκια, στο αραχιδέλαιο, στη λεκιθίνη σόγιας ή σε σχετικά προϊόντα
- κατά τη διάρκεια θεραπείας με άλλα φάρμακα (όπως άλλες φιβράτες ή ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο που ονομάζεται «κετοπροφαίνη»)
- είχατε μία αλλεργική αντίδραση ή δερματική βλάβη από το φως του ήλιου ή από ακτινοβολία UV
- έχετε σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ, στους νεφρούς ή στη χοληδόχο κύστη
- έχετε παγκρεατίτιδα (φλεγμονή στο πάγκρεας που προκαλεί κοιλιακό πόνο), η οποία δεν οφείλεται σε υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα

Μην πάρετε το Lipidil NT εάν οτιδήποτε από τα παραπάνω σας αφορά. Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Lipidil NT.

## Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Lipidil NT εάν:

- έχετε προβλήματα στους νεφρούς ή στο ήπαρ σας
- μπορεί να έχετε φλεγμονή στο ήπαρ (ηπατίτιδα) - τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κιτρίνισμα του δέρματος και του λευκού των οφθαλμών (ίκτερος), αύξηση των ηπατικών ενζύμων (φαίνεται στις αιματολογικές εξετάσεις), πόνο στο στομάχι και φαγούρα
- έχετε υπολειπόμενο θυρεοειδή αδένιο (υποθυρεοειδισμό)

Εάν σας αφορά οτιδήποτε από τα παραπάνω (ή έχετε αμφιβολίες), απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Lipidil NT.

## Lipidil NT και επιδράσεις στους μυς

Σταματήστε να παίρνετε το Lipidil NT και δείτε αμέσως ένα γιατρό αν έχετε:

- ανεξήγητες κράμπες
- πόνο, ευαισθησία ή αδυναμία στους μυς.

Αυτό συμβαίνει επειδή αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει μυϊκά προβλήματα που μπορεί να είναι σοβαρά. Αυτά τα προβλήματα είναι σπάνια, αλλά περιλαμβάνουν φλεγμονή και λύση των μυών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική βλάβη ή ακόμη και σε θάνατο.

Ο γιατρός σας μπορεί να διενεργήσει εξετάσεις αίματος για να ελέγξει τους μυς σας πριν και μετά την έναρξη της θεραπείας. Ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων στους μυς είναι υψηλότερος σε μερικούς ασθενείς. Συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό σας εάν:

- είστε πάνω από 70 ετών
- έχετε προβλήματα με τους νεφρούς
- έχετε προβλήματα με το θυρεοειδή
- εσείς ή ένας στενός συγγενής έχει πρόβλημα στους μυς που παρουσιάζεται και σε άλλα μέλη της οικογένειας
- πίνετε μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος
- λαμβάνετε φάρμακα που ονομάζονται στατίνες για να μειώσετε τη χοληστερόλη (όπως σιμβαστατίνη, ατορβαστατίνη, πραβαστατίνη, ροσουβαστατίνη ή φλουβαστατίνη)
- είχατε ποτέ προβλήματα με τους μυς σας κατά τη διάρκεια θεραπείας με στατίνες ή φιβράτες (όπως φαινοφιβράτη, βεζαφιβράτη ή γεμφιβροζίλη).

Εάν σας αφορά οτιδήποτε από τα παραπάνω (ή έχετε αμφιβολίες), απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού πάρετε το Lipidil NT.

## Άλλα φάρμακα και Lipidil NT

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Συγκεκριμένα να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα:

- αντιπηκτικά για την αύξηση της ρευστότητας του αίματος (όπως βαρφαρίνη)
- άλλα φάρμακα που ελέγχουν τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα (όπως στατίνες ή φιβράτες), γιατί η λήψη μίας στατίνης ή κάποιας άλλης φιβράτης συγχρόνως με το Lipidil NT μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο προβλημάτων στους μυς
- μια συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων για την αντιμετώπιση του διαβήτη (όπως η ροσιγλιταζόνη ή η πιογλιταζόνη)
- κυκλοσπορίνη (ένα κατασταλτικό του ανοσοποιητικού συστήματος)

Εάν σας αφορά οτιδήποτε από τα παραπάνω (ή έχετε αμφιβολίες), απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Lipidil NT.

## Κύηση και θηλασμός

- Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, καθώς δεν είναι γνωστό με ποιο τρόπο μπορεί το Lipidil NT να επηρεάσει το αγέννητο μωρό σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το Lipidil NT μόνο εάν σας το επιτρέψει ο γιατρός σας.
- Μη χρησιμοποιείτε το Lipidil NT εάν θηλάζετε ή εάν σκοπεύετε να θηλάσετε το μωρό σας, γιατί δεν είναι γνωστό αν το Lipidil NT απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα.

### **Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων**

Αυτό το φάρμακο δεν θα επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγήσετε ή να χειριστείτε εργαλεία ή μηχανήματα.

### **Το Lipidil NT περιέχει λακτόζη, σακχαρόζη και σογιέλαιο.**

- Το Lipidil NT περιέχει σάκχαρα που ονομάζονται λακτόζη και σακχαρόζη. Εάν ο γιατρός σας σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
- Το Lipidil NT περιέχει σογιέλαιο. Εάν είστε αλλεργικός στα φιστίκια, στο αραχιδέλαιο ή στη σόγια, μην πάρετε αυτό το φάρμακο.
- Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

## **3. Πώς να πάρετε το Lipidil NT**

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ο γιατρός σας θα καθορίσει ποια είναι η κατάλληλη περιεκτικότητα για εσάς, ανάλογα με την κατάστασή σας, την αγωγή που λαμβάνετε και το προσωπικό επίπεδο κινδύνου.

### **Λήψη αυτού του φαρμάκου**

Μπορείτε να παίρνετε το δισκίο με ή χωρίς φαγητό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

- Καταπίνετε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό.
- Μην σπάτε ή μασάτε το δισκίο.

Θυμηθείτε επίσης ότι όσο παίρνετε Lipidil NT είναι επίσης σημαντικό:

- να ακολουθείτε μία δίαιτα χαμηλών λιπαρών
- να ασκείστε τακτικά.

### **Πόσο να πάρετε**

Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο την ημέρα.

Εάν ήδη παίρνετε ένα καψάκιο φαινοφιβράτης 200mg ή ένα δισκίο φαινοφιβράτης 160mg την ημέρα, μπορείτε να το αλλάξετε με ένα δισκίο Lipidil NT 145mg την ημέρα. Η ποσότητα φαρμάκου που θα λαμβάνετε θα είναι η ίδια.

### **Άτομα με προβλήματα στους νεφρούς**

Αν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς, ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε χαμηλότερη δόση. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σχετικά με αυτό.

### **Χρήση σε παιδιά και εφήβους**

Η χρήση του Lipidil NT δεν συνιστάται σε παιδιά και σε νεαρά άτομα κάτω των 18 ετών.

### **Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Lipidil NT από την κανονική**

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Lipidil NT από την κανονική ή εάν κάποιος άλλος πάρει το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό σας ή επικοινωνήστε με το πλησιέστερο νοσοκομείο.

### **Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Lipidil NT**

- Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση, πάρτε την επόμενη δόση τη συνηθισμένη ώρα.
- Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

### **Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Lipidil NT**

Μην σταματήσετε να παίρνετε το Lipidil NT εκτός εάν σας το συστήσει ο γιατρός σας ή εάν δεν νιώθετε καλά παίρνοντας το δισκίο, γιατί απαιτείται μακροχρόνια αγωγή. Εάν ο γιατρός σας σας συστήσει να σταματήσετε το φάρμακό σας, μην κρατήσετε τα υπόλοιπα δισκία εκτός εάν σας το πει εκείνος.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

#### 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

**Σταματήστε να παίρνετε το Lipidil NT και επισκεφθείτε αμέσως ένα γιατρό, εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες – μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική αγωγή:**

**Μη συχνές:** μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα

- κράμπες ή πόνο, ευαισθησία ή αδυναμία στους μυς - αυτά μπορεί να είναι σημεία φλεγμονής ή λύσης των μυών που ενδέχεται να προκαλέσουν ηπατική βλάβη ή ακόμη και θάνατο
- πόνο στο στομάχι - αυτό μπορεί να είναι σημείο φλεγμονής στο πάγκρεας (παγκρεατίτιδα)
- πόνο στο στήθος και δύσπνοια - αυτά μπορεί να είναι σημεία θρόμβου αίματος στον πνεύμονα (πνευμονική εμβολή)
- πόνο, ερυθρότητα ή πρήξιμο στα πόδια - αυτά μπορεί να είναι σημεία θρόμβου αίματος στο πόδι (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση)

**Σπάνιες:** μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα

- αλλεργική αντίδραση - τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα ή στο λαιμό, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή
- κιτρίνισμα του δέρματος και του λευκού των ματιών (ίκτερος) ή αύξηση των ηπατικών ενζύμων - αυτά μπορεί να είναι σημεία φλεγμονής του ήπατος (ηπατίτιδα)

**Μη γνωστές:** δεν είναι γνωστό πόσο συχνά εμφανίζονται

- σοβαρό δερματικό εξάνθημα, που είναι κόκκινο, ξεφλουδίζει και πρήζεται και μοιάζει με σοβαρό έγκαυμα
- μακροχρόνια προβλήματα στους πνεύμονες

Σταματήστε να παίρνετε το Lipidil NT και επισκεφθείτε αμέσως ένα γιατρό, εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες.

#### Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Εάν παρατηρήσετε κάποια από τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας:

**Συχνές:** μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα

- διάρροια
- πόνος στο στομάχι
- φούσκωμα (μετεωρισμός)
- ναυτία
- έμετος
- αυξημένα επίπεδα διαφόρων ηπατικών ενζύμων στο αίμα – φαίνονται στις εργαστηριακές εξετάσεις
- αύξηση της ομοκυστεΐνης (η αύξηση του συγκεκριμένου αμινοξέος στο αίμα έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας καρδιακής νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειακής νόσου, παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια σύνδεση)

**Όχι συχνές:** μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα

- πονοκέφαλος
- χολόλιθοι
- μειωμένη σεξουαλική επιθυμία
- εξάνθημα, κνησμός ή κόκκινες κηλίδες στο δέρμα
- αύξηση της κρεατινίνης (παράγεται από τους νεφρούς) – φαίνεται στις εργαστηριακές εξετάσεις.

**Σπάνιες:** μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα

- απώλεια μαλλιών
- αύξηση της ουρίας (παράγεται από τους νεφρούς) – φαίνεται στις εργαστηριακές εξετάσεις
- το δέρμα είναι περισσότερο ευαίσθητο στο ηλιακό φως, στις λάμπες και στις συσκευές μαυρίσματος
- μείωση της αιμοσφαιρίνης (που μεταφέρει το οξυγόνο στο αίμα) και του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων – φαίνονται στις εργαστηριακές εξετάσεις.

**Μη γνωστές:** δεν είναι γνωστό πόσο συχνά εμφανίζονται

- λύση των μυών
- επιπλοκές εξαιτίας παρουσίας λίθων στη χοληδόχο κύστη
- αίσθημα εξάντλησης (κόπωση)

Εάν παρατηρήσετε κάποια από τις παραπάνω ανεπιθύμητες, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

#### **Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών**

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας:

- στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, για την Ελλάδα, ή
- στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, [www.moh.gov.cy/phs](http://www.moh.gov.cy/phs), Fax: + 357 22608649, για την Κύπρο.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

## **5. Πώς να φυλάσσετε το Lipidil NT**

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε αυτό το φάρμακο σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη χάρτινη συσκευασία και την κυψέλη μετά τη λέξη «EXP» ή «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

## **6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες**

### **Τι περιέχει το Lipidil NT**

- Η δραστική ουσία είναι η φαινοφιβράτη. Κάθε δισκίο Lipidil NT 145mg περιέχει 145 mg φαινοφιβράτης.
- Τα άλλα συστατικά είναι: σακχαρόζη, λακτόζη μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική πυριτικοποιημένη, κροσποβιδόνη, υπρομελλόζη, νάτριο λαουρυλοθειικό, νάτριο δοκουσικό, μαγνήσιο στεατικό.
- Η επικάλυψη Opadry® του δισκίου περιέχει επίσης: πολυβινυλαλκοόλη, τιτανίου διοξείδιο (E 171), τάλκης, λεκιθίνη σόγιας, ξανθάνης κόμμι.

## **Εμφάνιση του Lipidil NT και περιεχόμενα της συσκευασίας**

- Τα Lipidil NT 145mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, είναι λευκά, επιμήκη, με το εκτόπωμα «145» στη μία και το «λογότυπο Fournier» στην άλλη πλευρά.
- Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψελών (blisters) των 10, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98, 100, 280, 300.
- Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

## **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής**

### **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα**

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.  
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Αλιμος.  
Τηλ.: 210 9891 777

### **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο**

Mylan IRE Healthcare Limited  
Unit 35/36  
Grange Parade  
Baldoyle Industrial Estate  
Dublin 13  
Ιρλανδία

### **Τοπικός Αντιπρόσωπος Κύπρου**

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Ατδ.,  
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 226,  
2234 Λατσία, Λευκωσία  
Τηλ.: 22 20 77 00

### **Παρασκευαστής**

Recipharm Fontaine  
Rue des Prés Potets  
21121 Fontaine les Dijon  
Γαλλία

Mylan Laboratories SAS  
Route de Belleville  
Lieu-dit Maillard  
01400 Châtillon- sur- Chalaronne  
Γαλλία

Mylan Hungary Kft.  
Mylan utca 1.  
Komárom, 2900  
Ουγγαρία

**Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) με τις ακόλουθες ονομασίες:**

Γερμανία:	Lipidil 145 ONE
Αυστρία:	Lipanthyl Nanopartikel 145 mg
Βέλγιο:	Lipanthylnano 145 mg
Λουξεμβούργο:	Lipanthylnano 145 mg
Τσεχία:	Lipanthyl NT 145 mg
Φινλανδία:	Lipanthyl Penta 145 mg
Γαλλία:	Lipanthyl 145 mg

Ελλάδα:	Lipidil NT 145 mg
Ουγγαρία:	Lipidil 145 mg
Ιρλανδία:	Lipantil supra 145 mg
Ιταλία:	Fulcrosupra 145 mg
Πολωνία:	Lipanthyl NT 145
Σλοβακία:	Lipanthyl NT 145 mg
Ισπανία:	Secalip 145 mg

**Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Μάιο 2021**